

Recomanacions davant les malalties infeccioses transmissibles

Com actuar quan una infermera portadora veu una petita ferida sota el guant al finalitzar una extracció

1

Juny 2019

Descripció del cas

La Nuria és una infermera d'Atenció Primària. Fa 7 anys li van diagnosticar que era portadora del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), i des de llavors realitza controls continus en el servei d'infeccions d'un altre centre per mantenir la seva privacitat. En aquests moments la càrrega viral pel VIH és indetectable.

Quan es disposava a realitzar l'extracció de sang a un usuari, aquest s'ha mogut i l'agulla li ha fregat la mà esquerra. La Núria no ha notat cap punxada i per tant ha continuat amb l'extracció. En treure's els guants comprova que tenia sang en el lloc on havia fregat l'agulla



Anàlisi de la situació

La Núria ha realitzat la tècnica correctament utilitzant guants. Durant el procediment no ha notat cap punxada ni ha percebut cap senyal d'alerta que la fes aturar.

Una vegada acabada l'extracció ha vist que tenia una rascada en el dors de la ma, era superficial i no era visible a través del guant.

La Núria ha netejat i desinfectat la ferida i ha notificat el cas al servei de salut laboral, que ha fet les següents valoracions:

- Quina probabilitat hi ha que la sang de la Núria passi a la persona que s'està fent l'extracció?
- La rascada era molt petita, per tant el volum de sang petit.
- L'agulla ha passat pel guant que ha fet de netejador de la petita quantitat de sang.
- En aquest moment la Núria tenia uns valors indetectable de carrega viral.

Respostes

La possibilitat que la sang de la Núria passi a l'usuari és molt escassa, però en cas de fer-ho la quantitat no seria suficient per transmetre cap infecció.

Es decideix:

- Informar l'usuari de l'accident biològic.
- S'ha de demanar que la Núria es faci una analítica de control per comprovar el seu estat serològic actual.
- Cal consultar amb el metge d'infeccions el procediment a seguir amb l'usuari i valorar si cal iniciar tractament antiretroviral.

Valorant que la Núria seguia amb uns valors virals baixos i que la quantitat de sang ha estat molt baixa, es decideix no realitzar profilaxis però és recomana que l'usuari segueixi un control viral segons protocol.