

El 4 de juliol de 2023 es va declarar la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i es va deixar sense efectes el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Després de la fi de l'emergència sanitària per COVID-19, les mesures de prevenció i control, adaptades a la situació actual, han de continuar adreçant-se, fonamentalment, a la població més vulnerable.

Els centres residencials de persones vulnerables són llocs especialment proclius a la propagació de la grip, la COVID-19 i d'altres virus respiratoris. A més, les persones residents en aquests centres poden tenir més risc de patir formes greus de malaltia a causa dels problemes de salut subjacents o sistemes immunes debilitats per l'edat.

Els centres sanitaris són també àmbits d'especial vulnerabilitat en què per al control de la transmissió de la COVID-19 es considera adequat l'aplicació de **les precaucions estàndard** per al control de la transmissió de virus respiratoris, però les lliçons apreses durant la pandèmia indiquen la necessitat de reforçar l'ús de màscara en determinats contextos i situacions.

L'ús de mascaretes és recomanable en els casos següents:

- Per a les persones que presentin símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 quan es trobin en espais compartits,
- A les urgències hospitalàries i d'atenció primària (incloses les sales d'espera).
- Per als professionals que treballen a les UCI i amb persones vulnerables.
- Per als professionals de la salut que atenguin persones amb símptomes d'infecció respiratòria.
- A les residències, en cas d'aparició de símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 o en èpoques d'elevada transmissió d'aquestes malalties

Es recomana que els treballadors que atenguin persones simptomàtiques utilitzin mascareta.

Pel que fa a la **població general**, no està indicat l'aïllament de casos confirmats ni la identificació i la quarantena de contactes estrets. No obstant això, sí que es recomana que les persones amb simptomatologia compatible amb una insuficiència respiratòria aguda segueixin les mesures de l'etiqueta respiratòria (en tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat, fer servir mocadors d'un sol ús, i llençar-los després del seu ús, evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca) incloent l'ús de màscara, especialment quan tinguin interacció amb persones vulnerables. Així mateix, a les persones especialment vulnerables se'ls recomana l'ús de màscara en àmbits de risc com en esdeveniments de concentració massiva de persones.

Per a més informació podeu clicar els següents enllaços:

<https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/01actualitat/2023/07juliol23/Nota-informativa-sobre-la-declaracio-de-la-finalitzacio-de-la-situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID.pdf>

https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/nCov/documentos/Nuevo_marco_estrategico_COVID-19_05072023.pdf

<https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/05/pdfs/BOE-A-2023-15552.pdf>

A qui, on i quan es **recomana** continuar portant la mascareta?



Persones simptomàtiques en espais compartits



Urgències hospitalàries i d'atenció primària
(inclosa la sala d'espera)



Professionals que treballin a les **UCI**
i amb **pacients vulnerables**



Professionals de la salut que atenguin persones
amb **simptomatologia d'infecció respiratòria**



Residències, en cas d'aparició de **símptomes**
o en **èpoques d'elevada transmissió**