

Cas clínic: Extravasació de contrast intravenós

PUIG LARA, G.; AVILÉS OLIVERA, M.; MESA CASTRO, A.; ARMERO MÁRQUEZ, G. (INFERMERES ABS VALL DEL TENES), SANTIAGO RAMIREZ T. (TCAI H. GERMANS TRIAS I PUJOL), PINAR MARRODÁN, L. (INFERMERA H. GERMANS TRIAS I PUJOL)

RESUM:

Presentació d'un cas clínic per una extravasació de contrast endovenós en senyora de 87 anys diabètica, invident i depenent per les activitats de la vida diària

METODOLOGIA:

Evolució gràfica de la lesió

DEFINICIÓ:

La extravasació de contrast intravenós en els teixits tous és una complicació poc freqüent i que pot succeir inclòs quan la tècnica d'injecció és correcta.

Les conseqüències de la extravasació varien des de reaccions cutànies lleus a lesions més greus amb necrosi, úlceres cutànies i síndrome compartimentat.

EVOLUCIÓ:

Senyora derivada a l'hospital per realitzar-se una prova amb contrast intravenós, que en el transcurs de la tècnica, s'extravasa, produint flebitis i necrosi dels teixits adjacents. Es proposa cirurgia plàstica al pacient, la qual cosa denega la família per l'estat de fragilitat de la pacient i sol·licita l'alta voluntària.

Es acollida al CAP, on realitzem les cures a domicili (segons pauta hospitalària) amb apòsit de malla hidròfila impregnada en Betadine 10% i embenatge semicompressiu per drenar..

A la última fase es va instaurar apòsit hidrocoloide adhesiu.

Epitelització de la lesió al dia quaranta vuit.

Evolució gràfica de la lesió :



CONCLUSIONS:

Malgrat ser una complicació greu i les patologies associades de la pacient, així com l'edat, en aquest cas, la lesió es va desenvolupar satisfactòriament sense altres complicacions o infeccions.

La prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament adient son les claus per evitar les lesions greus.